



Grandes Cultures

DLP 14-11-01009660

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 28 du 22 septembre 1998 - 2 pages Numéro ordre postal : 62

Colza

STADES : cotylédons à 2-3 feuilles

Ravageurs

ALTISES

Les adultes occasionnent des morsures de quelques mm sur les cotylédons et les jeunes feuilles, qui peuvent affaiblir la croissance des plantes. Les larves provoquent des dégâts au niveau du pétiole et du bourgeon terminal.

Seuils d'intervention :

3 pieds sur 10 touchés jusqu'à B2-B3 ou 20-30 captures cumulées par la suite.

Les premières captures ont commencé dans certains pièges, la semaine dernière dans le sud Seine et Marne et quelques sites de l'Essonne (voir carte ci-dessous). Il s'agit d'une date classique. Les morsures restent encore rares.

Pas d'intervention insecticide justifiée à l'heure actuelle.

TENTHREDES

Ces mouches oranges sont parfois piégées en grosses quantités dans les cuvettes dans certains secteurs de l'Essonne et de l'Est de la Seine et Marne. Les niveaux ne sont pas exceptionnels, on a déjà obtenu certaines années plus de 100 captures en une semaine. Pour l'instant, les larves ne sont pas présentes. A suivre.

Désherbage


Les repousses de céréales sont parfois bien présentes, surtout dans les parcelles implantées sans labour. Dès le stade 3 feuilles des graminées, une intervention spécifique peut être envisagée. On estime le seuil de nuisibilité pour le colza à 30 graminées / m². Il faut aussi penser à l'intérêt de ce désherbage dans la rotation.

Service Régional de la
Protection des
Végétaux
ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Imprimé à la station
D'Alertes
Agricoles de Rungis
Directeur gérant :
J. BOULUD

Publication périodique
C.P.A.P. n°536 AD
ISSN n°0767-5542


Tarif Courrier 340 F
Fax 425 F



Colza
Situation
ravageurs.
Blé
Nouveaux
herbicides.

BnF
S&T

P28



Blé

Désherbage

Deux nouvelles matières actives arrivent sur le marché pour cette nouvelle campagne. Dans le cadre de différentes associations, elles entrent dans la composition de 4 nouvelles spécialités (voir tableaux ci-contre). Le flupyrsulfuron a une efficacité satisfaisante sur vulpins (équivalente à la référence QUARTZ). Sur les paturins, annuel et commun, son efficacité est insuffisante. La carfentrazone apporte de son côté une action notamment sur les véroniques et sur gaillet (présent lors du traitement mais pas les relevées).

Nouvelles matières actives

	Flupysulfuron méthyl	Carfentrazone éthyl
Famille	Sulfonylurées	Triazolinones
Mode d'action	systemique	contact
Absorption	foliaire + racinaire	foliaire
Spectre	graminées + dicots	dicots

Mosaïque

Aux lieux cités la semaine dernière, il convient d'ajouter les communes suivantes : Mousseaux les Bray, Mons en montois, Cessoy en Montois et Paroy (source Chambre agriculture 77).

Nouvelles spécialités

	LEXUS XPE	LEXUS CLASS	ALLIE EXPRESS	PLATFORM EXPRESS
Firme	Du Pont	Du Pont	Du Pont	Du Pont
Composition	16.7% metsulfuron méthyl 33.3% flupyrsulfuron méthyl	16.7% flupyrsulfuron méthyl 33.3% carfentrazone méthyl	10% metsulfuron méthyl 40% carfentrazone éthyle	1.5% carfentrazone éthyle 60% MCP-P
Dose /ha	30 g	60 g	50 g	1 Kg
Cultures	Blé tendre hiver	Blé tendre hiver	Blé tendre hiver Orge hiver Blé dur hiver	Blé tendre hiver Orge hiver Blé dur hiver Avoine hiver
Class tox	Non classé	Xi irritant	Xi irritant	Xn nocif
Spectre	Anti-graminées + dicots	Anti-graminées + dicots	Anti-dicots	Anti-dicots
Epoque	3 F à fin tallage	3 F à fin tallage	3 F à 2 noeuds	3 F à épi 1 cm